Lomatuell® Pro

Gelbildendes Kontaktnetz

STERILE R

Do not use if package is damaged

CE 0123 MD

liegend lagern, store horizontally

Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG
Westerwaldstraße 4 · 56579 Rengsdorf, Germany
www.Lohmann-Rauscher.com · Made in Germany

4053728/2020-07

de Gebrauchsanweisung

Produktbeschreibung und Leistungsmerkmale
Lomatuell® Pro ist eine nicht klebende, flexible Wundauflage mit offener Netzstruktur und gutem Exsudatabfluss in den Sekundärverband (Wunddistanzgitter). Das Produkt besteht aus einem synthetischen Gittertüll, imprägniert mit einer fett- und hydrokolloidhaltigen Polymermatrix. In Verbindung mit Flüssigkeiten formen die Hydrokolloidpartikel ein Gel, welches mit der Vaseline eine amphiphile (hydrophil-lipophil) Schicht bildet. Ein Verkleben mit der Wunde wird weitgehend verhindert, die Wundheilung unterstützt und atraumatische Verbandwechsel ermöglicht. Lomatuell® Pro ist mit Unterdrucktherapie als Wunddistanzgitter kombinierbar* (oberflächliche Wunden) und kann in allen Exsudationsgraden eingesetzt werden. Das Produkt ist beidseitig anwendbar und lässt sich zudem für verschiedene Wundgrößen und Körperareale zuschneiden.

*basierend auf in-vitro Untersuchungen

Produktzusammensetzung
Vaseline, medizinisches Weißöl, Polyester (Polyethylenterephthalat), Natrium-Carboxymethylcellulose, Synthesekautschuk, Antioxidans Pentaerythritol tetrakis(3-(3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionat)

Zweckbestimmung
Lomatuell® Pro ist ein imprägnierter weitmaschiger Gittertüll, der oberflächliche Wunden vor Verklebungen schützt und den Exsudatabfluss begünstigt.

Indikationen
Lomatuell® Pro ist für folgende Indikationen geeignet:

Chronische Wunden:
- Ulcus cruris,
- diabetische Fußulcera,
- Dekubitus.

Akute Wunden:
- Riss-, Schnitt- und Schürfwunden,
- Verbrennungen zweiten Grades.

Post-chirurgische Wunden:
- Sekundär heilende Operationswunden,
- Spalthautentnahmestellen.

Kontraindikationen
Bekannte Allergie und / oder Überempfindlichkeit gegen eine der Produktkomponenten

Nebenwirkungen
In sehr seltenen Fällen können Hautirritationen und/oder Allergien auftreten.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen
Lomatuell® Pro ist steril, solange die Verpackung ungeöffnet und unbeschädigt bleibt. Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt oder versehentlich geöffnet ist.
Das Produkt ist für den Einmalgebrauch bestimmt und darf nicht resterilisiert werden.

Anwendungshinweise
Die Applikation erfolgt durch medizinisches Fachpersonal.

1. Vorbereitung:
Vor der Applikation von Lomatuell® Pro die Wunde durch Spülen (z.B. mit physiologischer Kochsalz- oder Ringerlösung) sorgfältig reinigen.

2. Anwendung:
Prüfen Sie vor dem Öffnen die Sterilbarriere auf offensichtliche Beschädigungen.
a) Öffnen der Sterilverpackung an der gekennzeichneten Stelle und sterileEntnahme des Produktes
b) Entfernen der beidseitig aufgebrachten Abdeckfolie
c) Lomatuell® Pro etwa 1 cm überlappend auf die Wunde aufbringen Um die Dimensionen der Wundauflage an die Wunde anzupassen, kann das Produkt beiBedarf mit einer sterilen Schere zugeschnitten werden.
d) Bei stark exsudierenden Wunden wird eine hoch absorbierende Wundauflage als Sekundärverband hinterlegt (z. B. Vliwazell® Saugkompresse), bei mäßig bis schwach exsudierenden Wunden reicht eine Mull- oder Vliesstoffkompresse (z. B.Gazin® Mullkompresse oder Vliwasoft® Vliesstoffkompresse). Um ein feuchtwarmes Wundmilieu zu unterstützen und die Wunde von außen gegen Keime und Bakterien zu schützen, kann die Wundauflage mit einem PU-Film fixiert werden (z. B. Suprasorb® F Folienverband). Bei erhöhtem Infektionsrisiko oder infizierten Wunden sollte die Fixierung mit luftdurchlässigen Fixiermaterialien (z.B. Curafix® H Breitfixierpflaster) erfolgen. Bei infizierten Wunden sind die bekannten Maßnahmen zur Infektbehandlung parallel durchzuführen.

3. Verbandwechsel:
Das empfohlene Verbandwechselintervall beträgt in der Regel 2-4 Tage. Je nach Art und Heilungsfortschritt der Wunde kann der Verband länger (bis max. 7 Tage) oder kürzer auf der Wunde belassen werden – in Absprache mit dem medizinischen Verantwortlichen.

4. Lager- und Transportbedingungen:
Lomatuell® Pro liegend lagern.

5. Entsorgung:
Produktabfälle können in Europa einem Abfallschlüssel aus Kapitel 18 01, Verpackungsabfälle einem Abfallschlüssel aus Kapitel 15 01 der Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnisverordnung – AVV) zugeordnet werden. Recyclingfähige Verpackungen sollten den jeweiligen nationalen Recyclingsystemen zugeführt werden.

Allgemeine Hinweise:
Bei Auftreten eines schwerwiegenden Vorkommnisses wenden Sie sich bitte an den Hersteller und die zuständigen Gesundheitsbehörden.